



TOME 2



PROGRAMME

"Identification des végétations
de zones humides
par bassin versant"

> L'Orne et la Dives

Clés de détermination des groupements végétaux de zones humides du bassin versant de l'Orne

Conservatoire Botanique National



CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
NATIONAL
DE BREST



TOME 2

Clés de détermination des groupements végétaux de zones humides du bassin versant de l'Orne

REDACTION

Conservatoire botanique national de Brest :
Lauriane LAVILLE, Cédric JUHEL

RELECTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Conservatoire botanique national de Brest :
Marie GORET, Catherine ZAMBETTAKIS

ILLUSTRATION DE COUVERTURE

Brullemail (61) • Lauriane LAVILLE (CBNB)

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

LAVILLE L., JUHEL C., 2017 - Identification des végétations de zones humides par bassin versant, l'Orne et la Dives. Tome 2 : Clés de détermination des groupements végétaux de zones humides du bassin versant de l'Orne. Villers bocage : Conservatoire Botanique National de Brest, 24 p.

SOMMAIRE

I	Contexte	2
II	Élaboration des clés.....	2
III	Conseils d'utilisation	5
IV	Clé des classes de formations et des classes phytosociologiques	7
V	Clé des ordres et des alliances phytosociologiques du bassin versant de l'Orne	13

I Contexte

Ces clés de détermination ont été élaborées dans le cadre du projet **de connaissance, d'identification et d'élaboration d'outil de reconnaissance des végétations de zones humides des bassins versants de l'Orne et de la Dives**. Leur principal objectif est de faciliter la reconnaissance des groupements végétaux humides, par le plus grand nombre et tout particulièrement par les opérateurs de terrain de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Cet outil permet d'identifier les groupements végétaux humides, ce à différents niveaux, de la formation végétale jusqu'à l'alliance. Les clés sont en lien avec les fiches descriptives des alliances de zones humides des bassins versants de l'Orne et de la Dives rédigées dans le cadre du programme.

II Élaboration des clés

Le référentiel phytosociologique utilisé pour l'élaboration de cette clé est celui du Conservatoire botanique national de Brest (Delassus, Magnanon *et al.*, 2014), ce dernier suit le prodrome des végétations de France jusqu'au rang de l'alliance (Bardat *et al.*, 2004), il intègre également les premières publications relatives au projet de déclinaison à l'association végétale, du prodrome des végétations de France version 2 (PVF 2), actuellement en cours. Les noms en français des formations et des classes végétales sont tirés du référentiel du CBNB (Delassus, Magnanon *et al.*, 2014), ils ont ponctuellement été modifiés. Le référentiel taxonomique suivi pour ces clés est celui proposé par l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : TAXREF v7.0.

Les principaux critères utilisés dans ces clés de déterminations sont, tout d'abord, physiologiques et écologiques (des critères facilement observables sur le terrain, sans entrer dans le détail de critères physico-chimiques difficilement mesurables). La floristique prend également une part importante dans la seconde partie (clé des ordres et des alliances). L'édification de ces clés suit dans la plupart des cas une démarche dichotomique. La première proposition est présentée derrière un numéro (X), la seconde est présentée dans le paragraphe suivant, précédé du même numéro X'. À la suite des descriptions physiologiques et écologiques des communautés, des listes floristiques sont proposées (entre crochets), sans être exhaustives, elles correspondent soit à des listes de choix permettant d'avancer dans la clé, soit à des listes d'espèces diagnostiques, présentant à la fois des taxons caractéristiques et/ou différentiels (en gras), et des taxons de haute fréquence (en non gras). À la suite de la description physiologico-écologique et de la liste floristique, figure un renvoi à la proposition suivante (par un nouveau numéro) ou au nom de l'unité phytosociologique déterminée.

Les clés de détermination ont été élaborées en deux parties :

La première partie, intitulée « clé des formations et des classes végétales », correspond à une approche essentiellement basée sur la physiologie et l'écologie de la végétation, ces critères ont été choisis afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à ces premiers niveaux de la clé, c'est-à-dire les formations végétales puis les classes végétales (Delassus, Magnanon *et al.*, 2014). Cette partie est utilisable sur tout le territoire de la région.

La seconde partie permet d'affiner le diagnostic sur la caractérisation du groupement végétal étudié en permettant aux personnes ayant une certaine pratique de la botanique de déterminer au minimum les groupements au niveau de l'alliance. Ce niveau d'information plus précis permet

notamment de répondre à certaines attentes des opérateurs de terrain, concernant la qualité écologique des habitats par exemple. La seconde clé présente une entrée en partie liée à la physionomie et à l'écologie des groupements, mais la principale différence avec la clé précédente concerne la partie floristique des groupements qui est plus détaillée, ce qui permet d'aboutir aux niveaux syntaxonomiques inférieurs que sont l'ordre et l'alliance.

Il est par ailleurs possible d'utiliser ces clés de détermination, soit pour une végétation observée directement sur le terrain, soit pour un relevé phytosociologique réalisé antérieurement.

Ces clés renvoient finalement aux fiches descriptives des communautés végétales humides correspondant au rang de l'alliance phytosociologique (Tome 4). L'intérêt de ces fiches est d'apporter des éléments de diagnostics complémentaires aux clés, permettant notamment de valider la détermination du groupement.

Clé 1 - Formations et classes

Description phytionomique et écologique

Renvoi à une autre ligne de la clé

<p>10 Groupement végétal généralement dominé par des espèces annuelles (facilement arrachables). Pelouse annuelle pionnière des sols inondés en hiver et exondés en été des bords d'étangs, de fossés, cours d'eau, mares et dépressions inondables dominé par des espèces non halophiles. Lors de l'étiage le substrat n'est jamais sec.</p>	<p>11</p>
<p>10' Groupement végétal dominé par des espèces vivaces (difficilement arrachables).</p>	<p>12</p>
<p>11 Groupement végétal herbacé, formant des gazons ras de faible biomasse, des sols inondables oligotrophes à mésotrophes. <i>[Juncus bufonius, J. tenageia, J. hybridus, Lythrum hyssopifolia, L. portula, Cyperus fuscus, C. flavescens, Gnaphalium uliginosum, Lophangium luteoalbum (= Gnaphalium luteoalbum L.), Myosurus minimus, Ranunculus sardous, Pulicaria vulgaris, Gypsophila muralis, Corrigiola littoralis, Polygonum aviculare s.l., Poa annua, Limosella aquatica, Elatine spp., Illecebrum verticillatum, Lysimachia minima (= Centunculus minimus L.), Exaculum pusillum, Cicendia filiformis, Hypericum humifusum, Radiola linoides, ...]</i></p>	<p>Pelouses annuelles amphibies oligotrophes <i>Juncetea Bufonii</i> p. 14</p>
<p>11' Groupement végétal pionnier, haut et éphémère, de biomasse importante, se développant sur des berges plus ou moins eutrophes et exondées en été. <i>[Bidens spp., Persicaria hydropiper, P. lapathifolia, P. mitis, Lipandra polysperma (= Chenopodium polyspermum L.), Echinochloa crus-galli, Ranunculus sceleratus, ...]</i></p>	<p>Friches annuelles amphibies eutrophes <i>Sidentetea tabarctae</i> p. 14</p>

[...] : liste floristique

Nom de classe phytosociologique en français ; en latin ; le n° de page renvoie à la clé des ordres et alliances

Clé 2 - Ordres et alliances

[...] : liste floristique :

- en gras, taxons caractéristiques ou différentiels de l'alliance
- en non gras, taxons fréquents dans l'alliance

<p>Forêts marécageuses <i>Alnetea glutinosae</i> Braun-Blanquet & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946</p>	
<p>1 Boulaie des substrats tourbeux, acides et oligotrophes. La strate herbacée y est assez clairsemée, s'exprimant au sein d'une strate muscinale dense, dominée par les espèces du genre <i>Sphagnum</i>. <i>[Betula pubescens, Sphagnum palustre, S. fimbriatum, S. flexuosum., Alnus glutinosa (occasionnel)]</i></p>	<p>56. <i>Sphagno-Alnion glutinosae</i></p>
<p>1' Aulnaie des substrats très organiques à tourbeux liée à un engorgement permanent du sol, mésotrophes à eutrophes. La strate herbacée est dominée par les espèces des roselières, des cariçaies ou des prairies hygrophiles. La strate muscinale, lorsqu'elle est présente, est assez ouverte et n'est jamais dominée par les sphaignes. <i>[Alnus glutinosa, Carex elongata, Phragmites australis, Phalaris arundinacea, Solanum dulcamara var. dulcamara, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, Carex spp., Juncus effusus, Lotus pedunculatus, etc.]</i></p>	<p>4. <i>Alnion glutinosae</i></p>

Numéro de la fiche descriptive (tome 4)

Nom d'alliance (ou ordre) phytosociologique (observée en vert et non observée en gris)

Figure 1 : Contenu des clés de détermination

III Conseils d'utilisation

Si les clés de détermination proposées ici sont conçues pour faciliter la caractérisation des groupements végétaux humides des bassins versants de l'Orne et de la Dives, il est toutefois conseillé de **réaliser un relevé phytosociologique** au préalable de l'utilisation de la clé. Un guide d'aide à la réalisation de relevés phytosociologiques sur le terrain a récemment été réalisé par le Conservatoire botanique, il est disponible sur simple demande (Delassus, 2015). Le relevé phytosociologique permet notamment de conserver une trace sur les informations physionomiques, écologiques et floristiques, qui ont permis d'aboutir à la caractérisation du groupement végétal et de pallier aux limites liées à l'utilisation d'une clé, qui se base sur un nombre de critères restreints pour aboutir à la détermination d'un groupement. Le relevé phytosociologique, au même titre que l'échantillon d'herbier, permet de revenir *a posteriori* sur la détermination initiale.

Lors de l'utilisation de la clé, au moment de la comparaison des espèces d'un relevé avec les listes floristiques proposées dans la clé, il est très fréquent de n'avoir en commun qu'une partie des taxons¹ proposés pour avancer dans la clé ou pour aboutir à un syntaxon². Afin de s'assurer de la détermination du groupement végétal, ces espèces en commun doivent être en nombre suffisant. Si ce nombre est très faible ou bien si l'évolution dans la clé n'aboutit à rien qui corresponde vraiment au groupement étudié, il convient alors d'en étudier les causes. Les limites peuvent provenir de la clé de détermination, il s'agit d'une première version qui devra être améliorée au fur et à mesure de l'avancée des connaissances, mais les limites peuvent également résulter de la manière de relever ou d'appréhender la végétation étudiée. Ci-dessous sont fournis les exemples les plus fréquents de groupements végétaux pour lesquels l'utilisation de la clé atteint ses limites.

- Le cas des **faciès floristico-physionomiques** : sur le terrain il arrive régulièrement d'être confronté à des faciès qui s'illustrent par la dominance forte d'une espèce par rapport aux autres. Cette dominance apparente peut biaiser l'interprétation, en masquant par exemple la présence plus discrète d'autres espèces diagnostiques. Il est donc important pour l'étude des groupements végétaux de **ne pas se fier uniquement à une espèce dominante**, mais bien d'étudier l'ensemble des espèces constituant la communauté végétale. Il est donc indispensable de travailler en présence/absence sur des ensembles floristiques homogènes, en veillant à bien prendre en compte l'ensemble des espèces du relevé.
- Le cas des **groupements fragmentaires** : si la surface occupée par un groupement végétal est trop restreinte pour qu'il se développe normalement, on dit que son aire minimale n'est pas atteinte. Dans ce cas, le groupement ne sera pas en mesure d'accueillir l'ensemble de son cortège floristique caractéristique, la composition floristique ne sera alors que partielle.
- Le cas des **complexes de groupements** : on rencontre fréquemment sur le terrain des secteurs où des groupements végétaux se télescopent en formant alors des complexes de groupements. Dans ces cas de figure, la liste floristique réalisée au travers du relevé phytosociologique permet de savoir quel est le cortège floristique dominant, en classant tout

¹ Le taxon est une unité quelconque (genre, famille, espèce, sous-espèce, etc.) des classifications hiérarchiques des êtres vivants. Généralement le terme est employé aux rangs spécifique (l'espèce) et subs spécifique (la sous-espèce). Dans la suite du texte pour plus de facilité, on parlera d'espèce.

² Le syntaxon est une unité quelconque (Classe, ordre, alliance, association ...) de la classification phytosociologique des végétations. Il est à cette classification ce que le taxon est à la classification des êtres vivants. Dans la suite du texte pour plus de facilité, on parlera de groupement végétal.

d'abord les espèces en fonction de leur appartenance à des groupes phytosociologiques et en comptant le nombre d'espèces de chaque groupe. Le groupe dominant est celui qui abrite le plus grand nombre d'espèces (attention au faciès). On réalise ainsi la **balance floristique** du groupement.

- Le cas des **communautés basales** : il est important d'évoquer la problématique des communautés floristiquement appauvries, privées d'espèces caractéristiques. Il s'agit de communautés basales, qui n'abritent plus que des espèces à large amplitude écologique et qui s'expriment souvent à la faveur de perturbations anthropiques sur le milieu (eutrophisation, remaniement du sol, remblaiement, drainage...). Dans ce cas les espèces de large amplitude écologique remplacent les espèces plus exigeantes sur le plan écologique, qui sont souvent des espèces caractéristiques de groupements végétaux. Ce sont ces derniers que l'on retrouve en particulier dans la clé de détermination des ordres et des alliances. Ainsi, dans le cas d'une végétation appauvrie floristiquement dans un contexte perturbé par certaines activités anthropiques (suspicion d'une communauté basale), la première clé de détermination pourra toujours être utilisée (formations et classes végétales), mais il sera probablement plus difficile de passer à la seconde (clé des alliances), par manque d'information floristique. Dans ce cas la détermination d'un groupement peut en rester au niveau de la classe ou de l'ordre.
- Le cas des **groupements non décrits** : il est aussi possible de rencontrer une végétation non décrite ou non signalée sur le territoire régional (absente de l'actuel catalogue des groupements végétaux du CBN de Brest) et dans ces cas, la végétation n'est alors pas prise en compte dans la clé de détermination. Ce ne sera qu'au fur et à mesure de l'avancée des connaissances que ces nouveaux groupements végétaux pourront être intégrés dans de prochaines versions de la clé. Ces clés constituent donc une version 1.0.

Par ailleurs, il existe sur le terrain de nombreux autres contextes particuliers, qui peuvent parfois rendre difficile l'utilisation des clés de détermination. Dans tous les cas, la réalisation d'un relevé phytosociologique, respectant *a minima* la règle de la triple homogénéité (floristique, écologique et physiologique), permettra d'améliorer la caractérisation du groupement et de revenir *a posteriori* sur la détermination.

Voici deux références bibliographiques, facilement transportables, conseillées pour aider à la détermination de la flore des zones humides de Basse-Normandie :

- Provost M., 1998 - *Flore vasculaire de Basse-Normandie : avec suppléments pour la Haute-Normandie*. Caen : Presses universitaires de Caen, 2 vol. (XXV-410 p.-32 p. de pl. en coul., XII-492 p.).
- Olivereau F., Robouam N., 2014 - *Guide des plantes des milieux humides*. Paris : Editions Belin, 239 p. (L'Indispensable guide des.. Fous de nature).

Abréviations :

gr. : groupe taxonomique

subsp. : sous-espèce (du latin *subspecies*)

spp. : plusieurs espèces (du latin *speciesplures*)

IV Clé des classes de formations et des classes phytosociologiques

1	Végétation terrestre ou amphibie (inondée de manière temporaire), dominée par des taxons capables de se maintenir dressés hors de l'eau.		2
1'	Communauté inondée quasiment en permanence et caractérisée par des espèces végétales présentant une profonde adaptation à la vie aquatique . [<i>Potamogeton</i> spp., <i>Lemna</i> spp., <i>Nuphar</i> spp., <i>Nymphaea</i> spp., <i>Utricularia</i> spp., <i>Ceratophyllum</i> spp., <i>Callitriche</i> spp., <i>Ranunculus</i> spp. sous-genre <i>Batrachium</i> , <i>Myriophyllum</i> spp., <i>Ruppia</i> spp., <i>Zannichellia</i> spp., etc.]	Végétation aquatique	5
2	Végétation souvent dominée par des espèces entièrement ligneuses : chaméphytes, nanophanérophytes, phanérophytes.		3
2'	Végétation dominée par des espèces herbacées, non ou à peine ligneuses (ou seulement à la base).	Végétation herbacée	10
3	Formation sous-arbustive rarement haute de plus de 0,5 m , plus ou moins dense. La strate supérieure est dominée par des sous-arbrisseaux (chaméphytes frutescents). [<i>Erica</i> spp., <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Sarcocornia</i> spp., <i>Halimione portulacoides</i>]	Lande ou fourré nain	32
3'	Formation généralement haute de plus de 1 m , dominée par des phanérophytes ou des nanophanérophytes .		4
4	Formation arbustive de 0,5 à (5-) 7 mètres plus ou moins dense et difficile à pénétrer selon leur hauteur. La strate supérieure est dominée par des arbrisseaux (nanophanérophytes) dont la plupart sont ramifiés dès la base (espèces cespiteuses).	Fourré arbustif	34
4'	Formation arborescente qui en général atteint une hauteur d'au moins 5 mètres , dont les arbres possèdent une densité suffisante pour que toute les strates sous-jacentes (arbustive, herbacée et muscinale) soit conditionnée par leur présence. La strate supérieure est dominée par de grands phanérophytes à troncs .	Forêt	35
5	Groupement végétal caractérisé par des espèces flottant librement à la surface de l'eau ou dans la masse d'eau (pleustophytes). Les individus peuvent parfois être faiblement et temporairement cramponnés au substrat au cours de l'année. [voir espèces 6 et 6']		6
5'	Groupement végétal caractérisé par des espèces aquatiques, enracinées la majeure partie de l'année.		7
6	Communauté annuelle des eaux stagnantes à faiblement courantes, mésotrophes à eutrophes , douces à saumâtres. [<i>Lemna minor</i> , <i>L. trisulca</i> , <i>Spirodela polyrhiza</i> , <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> , <i>Ceratophyllum demersum</i> , <i>Utricularia vulgaris</i> , <i>U. australis</i>]	Herbiers flottants des eaux riches en éléments nutritifs <i>Lemnetea minoris</i> p. 23	
6'	Communauté vivace dominée par les pleustophytes à tiges feuillées des eaux stagnantes peu profondes, pauvres en éléments nutritifs , pionnières des gouilles et chenaux des tourbières acides et alcalines. [<i>Utricularia intermedia</i> , <i>U. minor</i> , <i>Sparganium natans</i>]	Herbiers flottants des eaux pauvres en éléments nutritifs <i>Utricularieta intermedia - minoris</i>	
7	Communauté végétale dominée par des algues macroscopiques (charophytes). [Genres <i>Chara</i> , <i>Nitella</i> , <i>Tolypella</i> et <i>Lamprothamnium papulosum</i>]	Herbiers de Characées <i>Charetea fragilis</i>	
7'	Communauté végétale dominée par des plantes vasculaires .		8
8	Herbier marin . [<i>Zostera marina</i> , <i>Z. noltii</i>]	Herbiers marins à zostères <i>Zosteretea marinae</i>	
8'	Herbier caractérisé par d'autres espèces.		9

<p>9 Herbier aquatique des eaux salées à saumâtres, permanentes ou temporaires, arrière-littorales. [<i>Ruppia cirrhosa</i>, <i>R. maritima</i>, <i>Ranunculus peltatus</i> subsp. <i>baudotii</i>]</p>	<p>Herbiers saumâtres <i>Ruppia maritima</i> p. 24</p>
<p>9' Herbier aquatique enraciné, submergé ou à feuilles flottantes, des eaux douces à faiblement saumâtres, stagnantes ou courantes, oligo-mésotrophes à eutrophes, oligocalciques à calciques. [<i>Stuckenia pectinata</i> (= <i>Potamogeton pectinatus</i> L.), <i>Potamogeton</i> spp., <i>Ranunculus</i> sous- genre <i>Batrachium</i>, <i>Callitriche</i> spp., <i>Elodea</i> spp., <i>Ceratophyllum demersum</i>, <i>Myriophyllum</i> spp., <i>Groenlandia densa</i>, <i>Hottonia palustris</i>, <i>Zannichellia</i> spp.]</p>	<p>Herbiers dulçaquicoles phanérogamiques <i>Potamogeton pectinatus</i> p. 24</p>
<p>10 Groupement végétal généralement dominé par des espèces annuelles (facilement arrachables). Pelouse annuelle pionnière des sols inondés en hiver et exondés en été des bords d'étangs, de fossés, cours d'eau, mares et dépressions inondables dominé par des espèces non halophiles. Lors de l'étiage le substrat n'est jamais sec.</p>	<p>11</p>
<p>10' Groupement végétal dominé par des espèces vivaces (difficilement arrachables).</p>	<p>15</p>
<p>11 Groupement végétal littoral ou arrière-littoral, dominé par des espèces halophiles ou subhalophiles, crassulescentes ou non. [voir 14 et 14']</p>	<p>12</p>
<p>11' Groupement végétal dominé par des espèces non halophiles.</p>	<p>14</p>
<p>12 Groupement végétal herbacé, dominé par de petites espèces, non crassulescentes. [<i>Parapholis incurva</i>, <i>P. strigosa</i>, <i>Plantago coronopus</i>, <i>Sagina maritima</i>, <i>Catapodium marinum</i>]</p>	<p>Pelouses annuelles halophiles littorales <i>Sagina maritima</i></p>
<p>12' Groupement végétal dominé par des espèces crassulescentes.</p>	<p>13</p>
<p>13 Groupement végétal annuel pionnier plus ou moins bas et plus ou moins ouvert des vases salées littorales. [<i>Salicornia procumbens</i>, <i>S. europaea</i>, <i>Suaeda maritima</i>, <i>Tripolium pannonicum</i> (= <i>Aster tripolium</i> L.) (comportement annuel)]</p>	<p>Communautés éphémères des vases salées <i>Thero - Suaedetea splendidis</i></p>
<p>13' Groupement végétal annuel halonitrophile se développant sur les laisses de mer au niveau des estrans ou des prés salés ou près des zones de nidification d'oiseaux sur les falaises littorales. [<i>Atriplex littoralis</i>, <i>A. prostrata</i>, <i>A. laciniata</i>, <i>Cakile maritima</i>, <i>Tripleurospermum maritimum</i> (= <i>Matricaria maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>), <i>Euphorbia pepelis</i>, <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i>, <i>Kali soda</i> (= <i>Salsola kali</i> L. subsp. <i>kali</i>)]</p>	<p>Communautés éphémères des hauts de plages <i>Cakiletea maritima</i></p>
<p>14 Groupement végétal herbacé, formant des gazons ras de faible biomasse, des sols inondables oligotrophes à mésotrophes. [<i>Juncus bufonius</i>, <i>J. tenageia</i>, <i>J. hybridus</i>, <i>Lythrum hyssopifolia</i>, <i>L. portula</i>, <i>Cyperus fuscus</i>, <i>C. flavescens</i>, <i>Gnaphalium uliginosum</i>, <i>Laphangium luteoalbum</i> (= <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.), <i>Myosurus minimus</i>, <i>Ranunculus sardous</i>, <i>Pulicaria vulgaris</i>, <i>Gypsophila muralis</i>, <i>Corrigiola littoralis</i>, <i>Polygonum aviculare</i> s.l., <i>Poa annua</i>, <i>Limosella aquatica</i>, <i>Elatine</i> spp., <i>Illecebrum verticillatum</i>, <i>Lysimachia minima</i> (= <i>Centunculus minimus</i> L.), <i>Exaculum pusillum</i>, <i>Cicendia filiformis</i>, <i>Hypericum humifusum</i>, <i>Radiola linoides</i>, ...]</p>	<p>Pelouses annuelles amphibies oligotrophiles <i>Juncetea bufonii</i> p. 13</p>
<p>14' Groupement végétal pionnier, haut et éphémère, de biomasse importante, se développant sur des berges plus ou moins eutrophes et exondées en été. [<i>Bidens</i> spp., <i>Persicaria hydropiper</i>, <i>P. lapathifolia</i>, <i>P. mitis</i>, <i>Lipandra polysperma</i> (= <i>Chenopodium polysperma</i> L.), <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Ranunculus sceleratus</i>, ...]</p>	<p>Friches annuelles amphibies eutrophiles <i>Bidentetea tripartitae</i> p. 13</p>
<p>15 Groupement végétal dominé par des héliophytes, soumis à une inondation et/ou un engorgement du sol pendant au moins six mois de l'année. [voir espèces 16, 17 et 17']</p>	<p>16</p>
<p>15' Groupement végétal non dominé par des héliophytes.</p>	<p>18</p>

<p>16 Communauté assez haute à haute, généralement fermée, dominée par de grandes hélophytes. [<i>Phragmites australis</i>, <i>Oenanthe aquatica</i>, <i>Carex elata</i>, <i>C. acuta</i>, <i>Phalaris arundinacea</i>, <i>Mentha aquatica</i>, <i>Rumex conglomeratus</i>, <i>Sparganium erectum</i>, <i>Schoenoplectus lacustris</i> (= <i>Scirpus lacustris</i> L.), <i>Typha</i> spp., <i>Glyceria maxima</i>, <i>Equisetum fluviatile</i>, <i>Iris pseudacorus</i>, <i>Butomus umbellatus</i>, <i>Sagittaria sagittifolia</i>, <i>Eleocharis palustris</i>, <i>Cladium mariscus</i>, <i>Carex vesicaria</i>, <i>C. paniculata</i>, <i>C. pseudocyperus</i>, <i>C. acutiformis</i>, <i>C. riparia</i>, <i>Bolboschoenus maritimus</i> (= <i>Scirpus maritimus</i> L. p.p.), <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>]</p>	<p>Roselières et cariçaies <i>Phragmito australis</i> - <i>Magnocaricetea elatae</i> p. 20</p>
<p>16' Communauté basse, plus ou moins fermée, de petites hélophytes, riche en dicotylédones, voire dominée par elles. Les bryophytes et les hépatiques peuvent jouer un rôle important dans ces groupements, notamment pour les microphorbiaies. Ces communautés occupent souvent des surfaces limitées. [voir espèces 17 et 17']</p>	
<p>17 Communauté de petites hélophytes des eaux froides et bien oxygénées des sources et ruisselets, parfois en situation très ombragée. [<i>Chrysosplenium alternifolium</i>, <i>Cardamine amara</i>, <i>Carex remota</i>, <i>Stellaria alsine</i>, <i>Montia hallii</i> (= <i>Montia fontana</i> L. subsp. <i>amporitana</i>) ; Bryophytes : <i>Brachythecium rivulare</i>, <i>Cratoneuron filicinum</i>, <i>Palustriella commutata</i>, <i>Bryum pseudotriquetrum</i>]</p>	<p>Microphorbiaies <i>Montio fontanae</i> - <i>Cardaminetea amarae</i> p. 19</p>
<p>17' Prairie flottante composée de petites hélophytes accompagnées d'hémicryptophytes, peu diversifiée. [<i>Glyceria fluitans</i>, <i>G. declinata</i>, <i>G. notata</i>, <i>Nasturtium</i> spp., <i>Catabrosa aquatica</i>, <i>Leersia oryzoides</i>, <i>Helosciadium nodiflorum</i> (= <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.), <i>Berula erecta</i>, <i>Oenanthe crocata</i>]</p>	<p>Prairies flottantes et cressonnières <i>Glycerio fluitantis</i> - <i>Nasturtietea officinalis</i> p. 20</p>
<p>18 Communauté des fissures rocheuses plus ou moins suintantes, riches en fougères et bryophytes, des stations ombragées ou exposées au nord. [<i>Hymenophyllum tunbridgense</i>, <i>Polypodium interjectum</i>]</p>	<p>Pelouses épilithiques <i>Anogrammo leptophyllae</i> - <i>Polypodietea cambrici</i></p>
<p>18 Autre groupement végétal.</p>	
<p>19 Groupement végétal dont la physionomie est prairiale ou pelousaire et dominé par des espèces graminoïdes (graminées, joncs, carex), soumis à des contraintes d'origine naturelle ou anthropique fréquentes bloquant (ou ralentissant) la dynamique végétale : régime d'exploitation par fauche et/ou pâturage régulier, exposition aux marées, exposition aux vents violents et aux embruns, engorgement en eau du sol permanent, inondation de longue durée.</p>	
<p>19' Groupement végétal de mégaphorbiaie, d'ourlet ou de friche souvent dominé par des espèces à feuilles larges, non graminoides. Végétation non ou rarement et irrégulièrement contrainte (par l'homme ou les conditions du milieu), connaissant généralement une dynamique progressive (ceci peut se traduire par exemple par la présence d'arbres au stade juvénile illustrant l'évolution potentielle de la végétation).</p>	
<p>20 Groupement végétal littoral dominé par des espèces halophiles ou subhalophiles.</p>	
<p>20' Groupement végétal littoral ou non ne présentant pas de caractère halophile marqué.</p>	
<p>21 Prairie haute pionnière, des vases salées molles et longuement inondables de la slikke ou des dépressions du bas schorre dominée par les espèces du genre <i>Spartina</i>. [<i>Spartina</i> spp.]</p>	<p>Végétations pionnières vivaces des vases salées <i>Spartinetea glabrae</i> p. 13</p>
<p>21' Groupement végétal non dominé par les espèces du genre <i>Spartina</i>.</p>	
<p>22 Groupement végétal non dominé par les espèces du genre <i>Spartina</i>, des sols vaseux à sablo-vaseux pouvant se gorger d'eau et s'assécher très rapidement. [<i>Puccinellia maritima</i>, <i>P. fasciculata</i>, <i>P. distans</i>, <i>Armeria maritima</i>, <i>Limonium vulgare</i>, <i>Lysimachia maritima</i> (= <i>Glauca maritima</i> L.), <i>Artemisia maritima</i> subsp. <i>maritima</i>, <i>Juncus gerardi</i>, <i>Plantago maritima</i>, <i>Limonium auriculae-ursifolium</i>, <i>L. normanicum</i>, <i>Festuca rubra</i>]</p>	<p>Prés salées <i>Asteretea tripolii</i> p. 14</p>

subsp. <i>littoralis</i> , <i>Frankenia laevis</i> , <i>Juncus maritimus</i> , <i>Carex extensa</i>]		
22'	Groupement végétal des fissures et replats rocheux des falaises maritimes exposées aux vents et aux embruns. [<i>Crithmum maritimum</i> , <i>Armeria maritima</i> , <i>Festuca rubra</i> subsp. <i>pruinosa</i> , <i>Silene uniflora</i> subsp. <i>uniflora</i> (= <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>maritima</i> (With.) A.Löve & D.Löve), <i>Asplenium marinum</i> , <i>Crithmum maritimum</i> , <i>Limonium binervosum</i> , <i>L. dodartii</i> , <i>Limbaria crithmoides</i> (= <i>Inula crithmoides</i> L.), <i>Plantago holosteum</i> var. <i>littoralis</i> , <i>P. littoralis</i> , <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>oceanica</i> , <i>Daucus carota</i> subsp. <i>gadecaei</i> , <i>Daucus carota</i> subsp. <i>gummifer</i> , etc.]	Pelouses aérohalophiles <i>Armerio maritimae</i> - <i>Festucetea pruinosa</i>
23	Groupement végétal hygrophile à amphibie , subissant des inondations plus ou moins longues en hiver. Le sol présente des traces d'hydromorphie dès la surface. [voir espèces 24, 25, 26 et 26']	
		24
23'	Groupement végétal mésogyrophile à xérophile , jamais submergé. Le sol ne présente pas de traces d'hydromorphie dès la surface. [voir espèces 27, 28 et 28']	
		27
24	Groupement végétal tourbeux des terrains saturés en eau jusqu'en surface par affleurement de la nappe phréatique, en général sans ou avec un écoulement lent et permanent. Les sols sont gorgés d'eau toute l'année, tourbeux (ou, si minéraux, plus ou moins enrichis en matière organique) et plus ou moins pauvres en nutriments. [<i>Rhynchospora</i> spp., <i>Eriophorum angustifolium</i> , <i>Drosera intermedia</i> , <i>Lycopodiella inundata</i> , <i>Carex nigra</i> , <i>C. echinata</i> , <i>C. lasiocarpa</i> , <i>C. rostrata</i> , <i>C. pulicaris</i> , <i>C. curta</i> , <i>Viola palustris</i> , <i>Potentilla palustris</i> , <i>Menyanthes trifoliata</i> , <i>Juncus acutiflorus</i> , <i>J. subnodulosus</i> , <i>Sphagnum</i> spp., <i>Schoenus nigricans</i> , <i>Carex viridula</i> var. <i>viridula</i> , <i>C. davalliana</i> , <i>Dactylorhiza praetermissa</i> , <i>Epipactis palustris</i> , <i>Oenanthe lachenalii</i> , <i>Hydrocotyle vulgaris</i>]	Groupements des bas-marais et radeaux flottants <i>Scheuzerio palustris</i> - <i>Caricetea fuscae</i> p. 14
24'	Groupement végétal différent.	
		25
25	Pelouse pionnière amphibie des bords exondés d'étangs et de cours d'eau mésotrophes à oligotrophes ou des dépressions temporairement inondées. [<i>Hypericum elodes</i> , <i>Eleocharis multicaulis</i> , <i>Littorella uniflora</i> , <i>Isolepis fluitans</i> , <i>Pilularia globulifera</i> , <i>Juncus bulbosus</i> , <i>Luronium natans</i> , <i>Potamogeton polygonifolius</i> , <i>Ranunculus flammula</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Baldellia repens</i>]	Pelouses mésotrophes à oligotrophes amphibies <i>Littorelletea uniflorae</i> p. 14
25'	Prairie hygrophile dense et fermée d'optimum estival.	
		26
26	Prairie hygrophile liée aux terrains régulièrement inondés, plats et mal drainés, oligotrophes à mésotrophes . Les sols sont généralement minéraux enrichis en matière organique (paratourbeux) mais rarement tourbeux (couche de tourbe fine). Riche en espèces des bas-marais. [<i>Molinia caerulea</i> , <i>Agrostis canina</i> , <i>Juncus acutiflorus</i> , <i>Carex demissa</i> , <i>C. panicea</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Scorzonera humilis</i> , <i>Trocdaris verticillatum</i> (= <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch), <i>Cirsium dissectum</i> , <i>Lysimachia tenella</i> (= <i>Anagallis tenella</i> (L.) L.), <i>Carex laevigata</i> , <i>Ranunculus flammula</i> , <i>Silaum silaus</i> , <i>Cirsium tuberosum</i> , <i>Genista tinctoria</i> , <i>Carex tomentosa</i> , etc.]	Prairies marécageuses <i>Molinio caeruleae</i> - <i>Juncetea acutiflori</i> p. 15
26'	Prairie hygrophile liée aux terrains minéraux, mésotrophes à eutrophes , régulièrement inondés le long des vallées. L' inondation se fait essentiellement de façon latérale par ruissellement (dont le débordement des cours d'eau). [<i>Agrostis stolonifera</i> , <i>Trifolium fragiferum</i> , <i>Mentha pulegium</i> , <i>Potentilla reptans</i> , <i>Juncus articulatus</i> , <i>Rumex crispus</i> , <i>Lysimachia nummularia</i> , <i>Argentina anserina</i> (= <i>Potentilla anserina</i> L. subsp. <i>anserina</i>), <i>Ranunculus repens</i> et la présence d'espèces des mégaphorbiaies (<i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Thalictrum flavum</i> , <i>Lythrum salicaria</i> ...). Espèces communes avec les <i>Arrhenatheretea</i> : <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Taraxacum</i> gr. <i>officinale</i> , <i>Lychnis flos-cuculi</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Lolium perenne</i> , <i>Rumex crispus</i> , <i>Potentilla reptans</i>]	Prairies inondables <i>Agrostietea stoloniferae</i> p. 15

<p>27 Groupement végétal généralement peu haut et peu dense (faible biomasse) se développant en conditions subhumides liées à un stress trophique (oligotrophie). Pelouse oligotrophile, mésophile à mésohygrophile liée aux sols acidoclines à acides. [<i>Nardus stricta</i>, <i>Agrostis capillaris</i>, <i>Viola canina</i>, <i>Pilosella lactucella</i> (= <i>Hieracium lactucella</i> Wallr.), <i>Luzula campestris</i>, <i>L. multiflora</i> (= <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>), <i>Dactylorhiza viridis</i> (= <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.), <i>Carex pilulifera</i>]</p>	<p>Pelouses des sols acides <i>Nardetea strictae</i> p. 16</p>
<p>27' Groupement végétal généralement assez haut et dense (biomasse importante) se développant dans des milieux fertiles à très fertiles (méso-eutrophes à eutrophes). [voir 28 et 28']</p>	<p>28</p>
<p>28 Communauté herbacée plus ou moins fermée, dominée par les graminées et riche en hémicryptophytes des pâtures et prairies de fauche mésophiles, parfois mésohygrophiles, sur sols relativement fertiles à fertiles. [Espèces communes avec les <i>Agrostietea</i>: <i>Plantago lanceolata</i>, <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>, <i>Trifolium repens</i>, <i>Taraxacum</i> gr. <i>officinale</i>, <i>Lychnis flos-cuculi</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Ranunculus repens</i>, <i>Lolium perenne</i>, <i>Rumex crispus</i>, <i>Potentilla reptans</i>. Espèces différentielles des <i>Arrhenatheretea</i> par rapport aux <i>Agrostietea</i>: <i>Agrostis capillaris</i>, <i>Lotus corniculatus</i>, <i>Luzula campestris</i>, <i>Medicago lupulina</i>, <i>Bromopsis erecta</i> (= <i>Bromus erectus</i> Huds. subsp. <i>erectus</i>), <i>Carex caryophyllea</i>, <i>Cerastium arvense</i> (= <i>Cerastium arvense</i> L. subsp. <i>arvense</i>), <i>Galium pumilum</i> (= <i>Galium pumilum</i> Murray subsp. <i>pumilum</i>), <i>G. verum</i> (= <i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i>), <i>Pilosella officinarum</i> (= <i>Hieracium pilosella</i> L.), <i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hispidus</i>, <i>Phleum nodosum</i> (= <i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>bertolonii</i> (DC.) Bornm.), <i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i>, <i>Thymus</i> gr. <i>serpyllum</i>, <i>Jacobaea vulgaris</i> (= <i>Senecio vulgaris</i> L.), <i>Saxifraga granulata</i> subsp. <i>granulata</i>, <i>Polygala vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>, <i>Potentilla erecta</i>, <i>Primula veris</i>, <i>Poterium sanguisorba</i> s.l. (= <i>Sanguisorba minor</i> Scop.)]</p>	<p>Prairies mésophiles <i>Arrhenatheretea elatioris</i> p. 17</p>
<p>28' Groupement végétal graminéen nitrophile, souvent sub-rudéral, sur sable, limons et substrats calcaires intérieurs ou dans les niveaux supérieurs de marais salés. [<i>Elytrigia repens</i>, <i>E. atherica</i>, <i>E. campestris</i>, etc.]</p>	<p>Ourlets sub-rudéraux et nitrophiles <i>Agropyretea pungentis</i> p. 18</p>
<p>29 Communauté haute, dense et emmêlée de grandes herbes à larges feuilles des lisières forestières humides et bords de cours d'eau mésotrophiles à eutrophiles. Peut parfois se développer de façon surfacique dans les prairies et pelouses abandonnées. [<i>Filipendula ulmaria</i>, <i>Angelica sylvestris</i>, <i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>repens</i>, <i>Urtica dioica</i>, <i>Calystegia sepium</i>, <i>Cirsium palustre</i>, <i>Lythrum salicaria</i>, <i>Eupatorium cannabinum</i>]</p>	<p>Mégaphorbiaies <i>Filipendulo ulmariae</i> - <i>Convolvuletea sepium</i> p. 18</p>
<p>29' Communauté ne présentant pas les caractères précédents. [espèces différentes]</p>	<p>30</p>
<p>30 Ourlet ou pelouse préforestière acidiphile et oligotrophile. [<i>Hypericum pulchrum</i>, <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Hieracium</i> gr. <i>sabaudum</i>, <i>H. lachenalii</i>, <i>H. umbellatum</i>, <i>Teucrium scorodonia</i>, <i>Melampyrum pratense</i>, <i>Holcus mollis</i>, <i>Avenella flexuosa</i> (= <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.), <i>Viola riviniana</i>, <i>Lonicera periclymenum</i>, <i>Rumex acetosella</i>]</p>	<p>Ourlets acidiphiles et oligotrophiles <i>Melampyro pratensis</i> - <i>Holcetea mollis</i> p. 19</p>
<p>30' Communauté herbacée vivace des lisières, bords de routes, coupes forestières ou terrains agricoles ou urbanisés abandonnés riches en azotes. Généralement dominée par des dicotylédones, plus rarement par des graminées. [voir 31 et 31']</p>	<p>31</p>
<p>31 Communauté herbacée vivace d'ourlet préforestier ou interne, sciaphile à hémisciaphile, mésophile à mésohygrophile, nitrophile à eutrophile, des lisières, bords de routes, coupes forestières ou terrains agricoles ou urbanisés abandonnés riches en azotes. Généralement dominée par des dicotylédones, plus rarement par des graminées. [<i>Lapsana communis</i>, <i>Geum urbanum</i>, <i>Urtica dioica</i>, <i>Elymus caninus</i>, <i>Stachys sylvatica</i>, <i>Epilobium ciliatum</i> (= <i>Epilobium adenocaulon</i> Hausskn.)]</p>	<p>Friches nitrophiles dominées par les vivaces <i>Artemisietea vulgaris</i> p. 19</p>
<p>31' Communauté des milieux fortement anthropisés, nitrophile. [<i>Silene latifolia</i> (= <i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet), <i>Artemisia vulgaris</i>, <i>Cirsium vulgare</i>, <i>Malva sylvestris</i>, <i>Urtica dioica</i>, <i>Verbena officinalis</i>, <i>Cirsium arvense</i>, <i>Dipsacus fullonum</i>, forte participation des espèces exogènes, archéophytes et néophytes]</p>	<p>Ourlets nitrophiles <i>Galio aparines</i> - <i>Urticetea dioicae</i> p. 19</p>

<p>32 Groupement végétal chaméphytique des sols salés dominés par des chaméphytes à appareils chlorophylliens crassulescents. [<i>Sarcocornia</i> spp., <i>Halimione portulacoides</i>]</p>	<p>Fourrés nains crassulescents littoraux <i>Salicorniotea fruticosae</i> p. 21</p>
<p>32' Groupement végétal chaméphytique des sols non salés. [Autres espèces]</p>	<p>33</p>
<p>33 Groupement végétal caractérisant une lande : ensembles structurels de taille basse (de quelques centimètres) à moyenne (jusqu'à 1,50 m) toujours dominés et donc structurés par des chaméphytes frutescents généralement sempervirents se développant de manière contiguë (les individus se touchent). Se développent sur des sols pauvres, souvent podzolisés. Les sphaignes peuvent être présentes mais ne participent pas à l'édification de tourbe (<i>Sphagnum compactum</i>, <i>S. tenellum</i>). [<i>Erica</i> spp., <i>Calluna vulgaris</i>, <i>Ulex minor</i>]</p>	<p>Landes <i>Calluna vulgaris</i> - <i>Ulicetea minoris</i> p. 21</p>
<p>33' Tourbière ombrominérotrophe à ombrotrophe, bas, caractérisé par une strate herbacée marquée par les chaméphytes frutescents se développant sur une strate muscinale dense dominée par les espèces du genre <i>Sphagnum</i> qui contribuent à l'édification de tourbe. Les espèces herbacées peuvent occuper une place plus ou moins importante et codominer dans les groupements. [<i>Erica tetralix</i> (absence ou rareté d'<i>E. ciliaris</i>), <i>Calluna vulgaris</i>, <i>Vaccinium oxycoccus</i>, absence ou rareté des <i>Ulex</i>; Bryophytes : <i>Sphagnum papillosum</i>, <i>S. rubellum</i>, <i>S. magellanicum</i>, <i>S. capillifolium</i>]</p>	<p>Tourbières <i>Oxycocco palustris</i> - <i>Sphagnetea magellanici</i> p. 21</p>
<p>34 Groupement végétal arbustif mésophile à mésohygrophile, mésotrophe à eutrophe. [<i>Prunus spinosa</i>, <i>Rosa</i> gr. <i>canina</i>, <i>Crataegus monogyna</i>, <i>Clematis vitalba</i>, <i>Corylus avellana</i>, <i>Sambucus nigra</i>. <i>Ulex europaeus</i> peut être présent mais il est accompagné des espèces précédentes ; en contexte alluvial, la strate supérieure est marquée par la présence de <i>Salix atrocinerea</i> en mélange avec des espèces plus mésophiles (<i>Viburnum lantana</i>, <i>Rhamnus cathartica</i>, etc.)]</p>	<p>Fourrés mésophiles à hygrophiles des sols riches <i>Crataego monogynae</i> - <i>Prunetea spinosae</i> p. 22</p>
<p>34' Groupement végétal arbustif mésophile à mésohygrophile sur sols oligotrophes. [<i>Rubus</i> spp. (notamment <i>R. ulmifolius</i>), <i>Ulex europaeus</i>, <i>Frangula alnus</i>, <i>Cytisus scoparius</i> var. <i>scoparius</i>, <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Erica scoparia</i>, <i>Erica cinerea</i>, <i>Juniperus communis</i>]</p>	<p>Fourrés mésophiles à hygrophiles des sols pauvres <i>Franguletea alni</i> p. 22</p>
<p>35 Groupement végétal forestier dont la strate arborée est dominée par une ou plusieurs des essences suivantes : [<i>Alnus glutinosa</i>, <i>Fraxinus</i> spp., <i>Betula pubescens</i>, <i>Ulmus</i> spp., <i>Salix alba</i>, <i>S. fragilis</i>, <i>S. x rubens</i>, <i>S. triandra</i> ; la strate herbacée est marquée par l'abondance d'espèces hygrophiles]</p>	<p>36</p>
<p>35' Groupement végétal forestier caducifolié dont la strate arborescente est dominée par une des essences suivantes : [<i>Quercus robur</i>, <i>Q. petraea</i>, <i>Fagus sylvatica</i>, <i>Carpinus betulus</i>, <i>Populus tremula</i> ; si <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Betula pubescens</i> sont présents, la strate herbacée est pauvre en espèces de roselières et de cariçaies]</p>	<p>Forêts mésophiles à mésohygrophiles <i>Quercu roboris</i> - <i>Fagetea sylvaticae</i> p. 23</p>
<p>36 Groupement végétal forestier se développant sur des sols organiques (voire tourbeux) engorgés quasiment toute l'année. [<i>Alnus glutinosa</i>, <i>Betula pubescens</i> ; la strate herbacée est composée d'espèces de mégaphorbiaies, de roselières ou de cariçaies]</p>	<p>Forêts marécageuses <i>Alnetea glutinosae</i> p. 22</p>
<p>36' Groupement végétal forestier (arborescent) se développant en situation alluviale ou riveraine. Les sols sont régulièrement inondés, mais bien drainés en période sèche. [<i>Alnus glutinosa</i>, <i>Fraxinus excelsior</i>, <i>Ulmus minor</i>, <i>U. laevis</i>, <i>Salix alba</i>, <i>S. fragilis</i>, <i>S. x rubens</i> ; présence fréquente d'espèces nitrophiles comme <i>Urtica dioica</i>, <i>Convolvulus sepium</i>, faible représentation des espèces des roselières ou des cariçaies]</p>	<p>Forêts riveraines et alluviales <i>Salici purpureae</i> - <i>Populetea nigrae</i> p. 23</p>

V Clé des ordres et des alliances phytosociologiques du bassin versant de l'Orne

Pelouses annuelles amphibies oligotrophiles

Juncetea bufonii de Foucault 1988

1' Pelouse annuelle des **sols inondables**, exondés en **fin d'été**, oligotrophes à mésotrophes.

[*Elatine triandra*, *E. hexandra*, *Eleocharis ovata*, *E. acicularis*, *Limosella aquatica*, *Illecebrum verticillatum*]

Pelouses annuelles amphibies mésotrophiles à eutrophiles d'**optimum continentale**
22. *Eleocharition soloniensis*

1' Pelouse amphibie annuelle des **sols peu inondables**, exondés **dès le printemps**, des sols acides, oligotrophes, souvent en mosaïque avec des prairies oligotrophiles du *Juncion acutiflori*.

[*Cicendia filiformis*, *Exaculum pusillum*, *Moenchia erecta* subsp. *erecta*, *Aira caryophyllea* s.l., *Radiola linoides*]

Pelouses annuelles amphibies oligotrophiles et acidiphiles atlantiques à ouest-méditerranéennes
19. *Cicendion filiformis*

Friches annuelles amphibies eutrophiles

Bidentetea tripartitae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951

1' Friche annuelle pionnière des vases **organiques** enrichies en azote, occupe les bordures des mares et des étangs ou les zones d'atterrissement des cours d'eau et fossés.

[*Rumex maritimus*, *R. palustris*, *Ranunculus sceleratus*, *Persicaria hydropteris*, *Bidens tripartita*, *B. frondosa*, *B. cernua*, *B. radiata*, *B. connata*, *Persicaria lapathifolia*, *Rorippa palustris*]

Friches annuelles amphibies eutrophiles des sols **limoneux et argileux**
10. *Bidention tripartitae*

1' Friche annuelle pionnière des substrats **minéraux**, généralement alluviaux, plus ou moins enrichis en azote, qui se développe sur les berges de plans d'eau ou de cours d'eau soumis à des variations du niveau de l'eau.

[*Corrigiola littoralis*, *Lipandra polysperma* s.l. (= *Chenopodium polyspermum* L.), *Amaranthus blitum* subsp. *emarginatus*, *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*, *Oxybasis glaucum* (= *Chenopodium glaucum* L.), *Xanthium italicum*, *X. orientale*, *Amaranthus hybridus* subsp. *bouchonii*, *A. hybridus* var. *pseudoretroflexus*, *Digitaria sanguinalis*]

Pelouses annuelles amphibies mésotrophiles des sables et graviers exondés
18. *Chenopodium rubri*

Végétations pionnières vivaces des vases salées

Spartinetea glabrae Tüxen in Beefink 1962

1' Végétation pionnière vivace dominée par les spartines, des vases salées molles et longuement inondables de la slikke ou des dépressions du bas shorre.

[*Spartina x townsendii*, *S. anglica*, *S. maritima*]

Prairies des vases salées atlantiques longuement inondables
54. *Spartinion anglicae*

Prés salés

Asteretea tripolii Westhoff & Beefink in Beefink 1962

1' Pré salé du **bas schorre** et du **schorre moyen**, sur des sols dont la **salinité est élevée** (proche de celle de l'eau de mer) soit à cause d'une exposition directe à la mer, soit à cause d'une forte concentration en sel dans le sol.

[*Puccinellia maritima*, *P. fasciculata*, *P. distans*, *Spergula media* (= *Spergularia media* (L.) C. Pres)], présence d'espèces des vases molles : *Spartina* spp., *Salicornia* spp., *Suaeda maritima*]

1' Pré salé du **haut schorre** des sols **légèrement dessalés** des niveaux supérieurs du schorre, immergé par l'eau de mer que lors des marées de vives eaux.

[*Armeria maritima*, *Festuca rubra* subsp. *litoralis*, *Lysimachia maritima* (= *Glaux maritima*), *Juncus gerardi*, *Plantago maritima*, *Limonium normannicum*, *L. auriculatae-ursifolium*]

Prés salés des **schorres inférieurs et moyens**
47. *Puccinellion maritimae*

Prés salés du **haut schorre** et du **contact avec la dune**
8. *Armerion maritimae*

Pelouses mésotrophiles à oligotrophiles amphibies

Littorelletea uniflorae Braun-Blanquet & Tüxen ex Westhoff, Dijk, Passchier & Sissingh 1946

1' Pelouse amphibie, **acidiphile**, des grèves sablonneuses ou tourbeuses d'étangs ou de zones humides oligotrophes à mésotrophes. Le substrat peut éventuellement être oligohalin.

[*Isolepis fluitans* (= *Scirpus fluitans*), *Hypericum elodes*, *Potamogeton polygonifolius*, *Pilularia globulifera*, *Helosciadium inundatum*, *Ludwigia palustris*, *Luronium natans*, *Ranunculus ololeucus*, *Antinoria agrostidea*, *Carex viridula* var. *viridula*]

1' Pelouse amphibie, **neutrophile à basiphile**, des sols sablonneux ou tourbeux de zones humides oligotrophes à mésotrophes peu profondes et longuement inondées. Le substrat peut éventuellement être oligohalin.

[*Samolus valerandi* associé aux espèces des unités supérieures : *Littorella uniflora*, *Baldellia repens*, *Ranunculus flammula*, etc.]

Pelouses vivaces amphibies oligotrophiles à mésotrophiles et acidiphiles des bordures de plans d'eau
23. *Elodea palustris* - *Sparganium*

Pelouses vivaces amphibies oligotrophiles à mésotrophiles et neutrophiles à basiphiles (voire oligohalines)
52. *Samolus valerandi* - *Baldellia ranunculoides*

Groupements des bas-marais et radeaux flottants

Scheuchzeria palustris - *Caricetea fuscae* Tüxen 1937

1' Végétation pionnière, dominée par les *Carex*, ouverte et basse des tonsures de bas-marais et des gouilles de cicatrisation au sein des haut-marais, sur sols oligotrophes et acides, dénudés, tourbeux à minéralo-tourbeux.

[*Drosera intermedia*, *Rhynchospora alba*, *R. fusca*]

1' Groupement de bas-marais sur sols acides à alcalins souvent caractérisé par l'abondance des cypéracées.

[voir espèces 2, 3 et 3']

2' Groupement tourbeux des dépressions des tourbières acidoclines à neutroclines et de transition. Ils forment souvent des radeaux et tremblants.

[*Carex lasiocarpa*, *C. rostrata*, *Menyanthes trifoliata*, *Potentilla palustris*]

2' Prairies de bas-marais acides à alcalins.

[voir espèces 3 et 3']

Pelouses pionnières des tonsures de bas-marais et des gouilles acidiphiles
49. *Rhynchosporion albae*

Prairies tourbeuses des bas-marais alcalins et de transition planitiaires à montagnardes
16. *Caricion lasiocarpae*

3

3 Végétation des sols tourbeux à paratourbeux, **acidiclines à acides**, oligotrophes et peu oxygénés. Ce type de communauté essentiellement montagnarde se retrouve souvent sous forme appauvrie dans les régions de plaine.

[*Carex echinata*, *C. curta*, *C. pulicaris*, *C. nigra*, *Viola palustris*, *Eriophorum angustifolium*, *Lysimachia tenella*, *Epilobium palustre*, *Molinia caerulea*, *Sphagnum palustre*, *S. subnitens*]

Prairies tourbeuses des bas-marais acides à acidiclines
14. *Caricion canescenti - nigrae*

3' Groupement des sols tourbeux, **alcalins** et oligotrophes, lié aux bas-marais alcalins planitiaires du domaine atlantique.

[*Schoenus nigricans*, *Carex viridula* var. *viridula*, *C. davalliana*, *Dactylorhiza praetermissa*, *Epipactis palustris*, *Juncus subnodulosus*, *Oenanthe lachenalii*, *Hydrocotyle vulgaris*]

Prairies tourbeuses des bas-marais alcalins atlantiques
32. *Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis*

Prairies marécageuses

Molinio caeruleae - *Juncetea acutiflori* Braun-Blanq. 1950

1 Prairie marécageuse atlantique à subatlantique, des sols engorgés, acidocline à acidiphile, oligotrophile à mésotrophile et plus ou moins enrichie en matière organique.

[*Juncus acutiflorus*, *J. conglomeratus*, *Agrostis canina*, *Carex ovalis*, *Trocodaris verticillatum* (= *Carum verticillatum* (L.) W.D.J.Koch), *Cirsium dissectum*, *Scorzonera humilis*, *Serratula tinctoria*, *Molinia caerulea*, *Lysimachia tenella*, *Carex demissa*, *Lobelia urens*, *Aristavena setacea* (= *Deschampsia setacea* (Huds.) Hack.), *Ranunculus flammula*]

Remarque : l'alliance du *Callithion palustris* n'apparaît pas dans la clé car elle est aujourd'hui remise en cause par plusieurs phytosociologues français. Celle-ci présente en effet une certaine hétérogénéité dans son traitement, intégrant autant des groupements végétaux prairiaux que des groupements végétaux de bas-marais ou de mégaphorbiaies. Le *Callithion palustris* caractérise des prairies marécageuses collinées à montagnardes des sols humides en permanence, acidiclines, mésotrophes à méso-eutrophes. Elles sont notamment caractérisées par le *Populus* des marais (*Caltha palustris*), la Renouée bistorte (*Polygonum bistorta*) et le Scirpe des bois (*Scirpus sylvaticus*).

Prairies humides des sols acides et oligotrophes
34. *Juncion acutiflori*

Prairies inondables

Agrostietea stoloniferae Oberd. 1983

1 Prairie hygrophile atlantique à subcontinentale des **bas niveaux longuement inondés** dans lesquelles les espèces prairiales des *Agrostietea stoloniferae* sont accompagnées d'un cortège d'**hélophytes**.

[*Denanthe fistulosa*, *Carex disticha*, *Stellaria palustris*, *Achillea ptarmica*, *Eleocharis palustris*, *Gratiola officinalis*, *Alopecurus geniculatus*, *Rorippa sylvestris*, *R. amphibia*, *Myosotis laxa* (= *Myosotis laxa* Lehm. subsp. *cespitosa* (C.F.Schultz) Hyl. ex Nordh.), *Persicaria amphibia* forme terrestre]

Prairies longuement inondables mésotrophiles atlantiques à subcontinentales
42. *Oenanthion fistulosae*

1' Prairie hygrophile des **niveaux moyens courtement inondés** (1 à 3 mois) différenciée par l'**absence des hélophytes** et la présence d'espèces des prairies mésophiles.

[*Agrostis stolonifera*, *Juncus effusus*, *Rumex acetosa*, *Cynosurus cristatus*, *Phleum pratense*, *Dactylis glomerata* subsp. *glomerata*, *Anthoxanthum odoratum*, *Cirsium palustre*, *Lotus pedunculatus*, *Filipendula ulmaria*, *Schedonorus arundinaceus* subsp. *arundinaceus*]

Potentillo anserinae - *Polygonetalia avicularis*
2

	(= Festuca arundinacea Schreb. subsp. arundinacea), Trifolium dubium, Bellis perennis, Lolium perenne, Cerastium fontanum subsp. vulgare]	
2	Prairie littorale courtement inondable subhalophile . [Lysimachia maritima (=Glaux maritima), Apium graveolens, Samolus valerandi, Carex distans var. vikingensis, Triglochin maritima, Plantago maritima]	Prairies inondables subhalophiles atlantiques à nord atlantiques 36. Loto tenuis - Trifolium fragiferi
2'	Prairie courtement inondable glycophile et/ou mésothermophile. [Absence des espèces subhalophiles mentionnées au 2]	3
3	Prairie courtement inondable généralement fauchée mais parfois aussi pâturée sur le regain, des sols mésotrophes. [Bromus racemosus, Hordeum secalinum, Achillea ptarmica, Oenanthe peucedanifolia, O. silaifolia, Trifolium patens, Gaudinia fragilis, Anacamptis laxiflora]	Prairies de fauche courtement inondables mésotrophiles atlantiques à précontinentales 12. Bromion racemosi
3'	Prairie courtement inondable pâturée . [Elles sont caractérisées par l'absence ou la rareté des espèces mentionnées en 3]	4
4	Prairie courtement ou longuement inondable très pâturée, surpiétinée , des sols eutrophes. [Plantago major, Juncus compressus, Argentina anserina (= Potentilla anserina), Potentilla reptans]	Prairies inondables piétinées 46. Potentillion anserinae
4'	Prairie courtement inondable non surpiétinée . [Absence ou rareté des espèces mentionnées en 4]	5
5	Prairie inondable pâturée des sols acidoclines à alcalins , mésotrophile et courtement inondable. [Juncus inflexus, Pulicaria dysenterica, Mentha longifolia, Epilobium parviflorum]	Prairies pâturées inondables mésotrophiles et acidoclines à basiphiles 38. Mentho longifoliae - Juncion inflexi
5'	Prairie pâturée peu caractérisée, acidocline à acidiphile . [Absence d'espèces caractéristiques, uniquement d'espèces communes à l'ensemble des prairies inondables]	Prairies pâturées inondables mésotrophiles et acidoclines à acidiphiles 48. Ranunculo repentis - Cynosurion cristati

Pelouses des sols acides

Nardetea strictae Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963

- 1 Pelouse vivace acidocline, hygrophile et piétinée, des tourbes asséchées ou tassées. Unique alliance de la classe hygrophile en Basse-Normandie.
[Juncus squarrosus, Carex panicea, C. nigra, C. echinata, Agrostis canina, Trocдарis verticillatum (= Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch), Erica tetralix, Gentiana pneumonanthe, Agrostis capillaris, Danthonia decumbens, Pilosella officinarum, Nardus stricta, Polygala serpyllifolia, Potentilla erecta, Carex pilulifera, Luzula congesta, Pedicularis sylvatica]

Pelouses acidiphiles mésohygrophiles atlantiques à subatlantiques
40. Nardo strictae - Juncion squarrosi

Prairies mésophiles

Arrhenatheretea elatioris Braun-Blanquet ex Braun-Blanquet, Roussine & Nègre 1952

1 Communauté herbacée prairiale essentiellement **fauchée**, parfois sous-pâturée. Elle occupe des stations moyennement humides à moyennement sèches et sont notamment caractérisées par des espèces fragiles et sensibles au piétinement.

[Arrhenatherum elatius s.l., Trisetum flavescens, Tragopogon pratensis s.l., Rhinanthus minor subsp. minor, Lathyrus pratensis, Heracleum sphondylium s.l., Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus, Vicia sativa, Trifolium dubium, Daucus carota subsp. carota]

1' Communauté herbacée prairiale essentiellement **pâturée** et/ou piétinée mésohygrophile à mésoxérophile.

[Absence ou rareté des espèces mentionnées en 1]

2 Prairie mésophile de fauche méditerranéo-atlantique.

[Gaudinia fragilis, Linum usitatissimum subsp. angustifolium (= Linum bienne), Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia, Malva moschata, la partie mésohygrophile de l'alliance est différenciée par Bromus racemosus, Oenanthe pimpinelloides, Schedonorus arundinaceus subsp. arundinaceus (= Festuca arundinacea Schreb. subsp. arundinacea), Juncus acutiflorus, Lotus pedunculatus, Anacamptis laxiflora subsp. laxiflora, Potentilla reptans, Filipendula ulmaria, Rumex crispus, Lychnis flos-cuculi]

2' Prairie mésophile (mésohygrophile à mésoxérophile) de fauche eurosibérienne, planitiaire à submontagnarde.

[Caractérisée par les taxons indiqués en 1 et absence des espèces caractéristiques de l'alliance du Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis, mentionnées en 2]

3 Prairie mésohygrophile de fauche planitiaire à collinéenne.

[Colchicum autumnale, Myosotis scorpioides s.l., Peucedanum chabraei (Jacq.) Rchb., Holandrea carvifolia i (Vill.) Reduron et al.), Silaum silaus, Ophioglossum vulgatum, Potentilla reptans, Hordeum secalinum, Carex hirta, Achillea ptarmica, Gaudinia fragilis, associés à d'autres taxons issus des prairies des Agrostietea stoloniferae et des mégaphorbiaies des Filipendulo - Convolvuletea sepium]

3' Prairie nitrophile avec forte régression ou disparition des taxons oligotrophiles à mésotrophiles des pelouses initiales.

[Rumex obtusifolius, Urtica dioica, Elytrigia repens et absence du cortège d'espèces hygrophiles mentionné en 3]

4 Prairie mésophile surpâturée planitiaire à collinéenne basse et ouverte, piétinée, eutrophile à mésotrophile. Groupement caractérisé par des espèces tolérant bien le piétinement.

[Plantago major, Lolium perenne, Dactylis glomerata subsp. glomerata, Achillea millefolium]

4' Prairie essentiellement pâturée et/ou piétinée caractérisée par l'absence significative des taxons prairiaux supportant mal les coupes fréquentes et le piétinement (Arrhenatheretea elatioris).

[Absence ou moindre fréquence des taxons mentionnés en 1, 2 et 3]

Arrhenatheretea
elatioris

2

4

Prairies mésohygrophiles à mésoxérophiles de fauche méditerranéo-atlantiques
11. Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis

Prairies mésohygrophiles à mésoxérophiles de fauche planitiales à submontagnardes

9. Arrhenatherion elatioris

3

Colchico autumnalis - Arrhenatherion elatioris

Rumici obtusifolii - Arrhenatherion elatioris

Prairies mésohydriques surpâturées, mésotrophiles à eutrophiles, planitiales à collinéennes

35. Lolio perennis - Plantaginion majoris

Prairies mésohydriques pâturées ou piétinées, mésotrophiles à eutrophiles, planitiales à montagnardes

21. Cynosurion cristati

Ourlets sub-rudéraux et nitrophiles

Agropyretea pungentis Géhu 1968

- 1 Prairie nitrophile des hauts de marais salés (schorres) enrichis en matières organiques, riche en espèces halophiles.
[*Elytrigia acuta*, *E. repens*, *E. acuta* × *E. repens*, *Beta vulgaris* subsp. *maritima*, *Atriplex prostrata*, *A. longipes*]

Remarque : Les taxons du genre *Elytrigia* sont particulièrement difficiles à différencier. En effet, dans ce groupe, les espèces ont une forte tendance à l'hybridation et au clonage. A ceci s'ajoute une grande variabilité morphologique à l'intérieur de chaque espèce. De cette difficulté résulte une multiplication de syntaxons pas toujours justifiée. Ainsi, pour l'exercice présenté ici, nous ne sommes descendus qu'au niveau de l'alliance dans l'attente d'éclaircissements.

Ourlets des prés salés d'Europe occidentale
3. *Agropyron pungentis*

Mégaphorbiaies

Filipendulo ulmariae - *Convolvuletea sepium* Géhu & Géhu-Franck 1987

- 1 Mégaphorbiaie marécageuse et alluviale, mésotrophile à eutrophile, des dépressions sujettes à inondation phréatique, sur sol enrichi en matière **organique**. Leur richesse spécifique est **élevée** (jusqu'à 30 espèces) et elles peuvent abriter des espèces **prairiales** ou de **bas-marais**.
[*Lotus pedunculatus*, *Scirpus sylvaticus*, *Lysimachia vulgaris*, *Stachys palustris*, *Cirsium palustre*, *Hypericum tetrapterum*, *Epilobium hirsutum*, *Symphytum officinale*, *Achillea ptarmica*]
- 1' Mégaphorbiaie riveraine et alluviale eutrophile, sur sédiment surtout **minéral** et souvent enrichi par des eaux eutrophes ou polluées. Richesse spécifique **faible** (5-20 espèces) et présence d'espèces nitrophiles des **friches** et **ourlets**.
[*Convolvulus sepium*, *Urtica dioica*, *Solanum dulcamara* var. *dulcamara*, *Rubus caesius*, *Galium aparine* subsp. *aparine*, *Cirsium arvense*]

Loto pedunculati - *Filipenduletalia ulmariae*
2

Convolvuletalia sepium
3

- 2 Mégaphorbiaie **acidicine à acidiphile** des dépressions sujettes à inondations phréatiques, caractérisée par la rareté ou l'absence des espèces basiphiles (voir 2').

[*Juncus effusus*, *J. acutiflorus*, *Oenanthe crocata*]

- 2' Mégaphorbiaie planitiaire mésotrophile à eutrophile, **neutrobasiophile**, des dépressions sujettes à inondations phréatiques.

[*Thalictrum flavum*, *Filipendula ulmariae*, *Althaea officinalis*, *Euphorbia palustris*, *Epilobium hirsutum*, *Eupatorium cannabinum*, *Hypericum tetrapterum*, *Solanum dulcamara* var. *dulcamara*, *Cirsium oleraceum*, *Scirpus sylvaticus*, *Scrophularia auriculata*, *Jacobaea paludosa* (= *Senecio paludosus*)]

- 3 Communauté eutrophile des **eaux douces** et de la partie moyenne et supérieure des cours d'eau et des bordures de lac.

[*Aegopodium podagraria*, *Humulus lupulus*, *Elytrigia repens*, *Glechoma hederacea*, *Myosoton aquaticum* plus la présence d'espèces des mégaphorbiaies plus mésotrophiles voir 2']

- 3' Communauté thermo- à nord-atlantique **oligohalophile** de zones subestuariennes, du cours inférieur des fleuves soumis aux marées d'eau douce à saumâtre et de salines intérieures.

[*Althaea officinalis*, *Oenanthe crocata*, *Oenanthe lachenalii*]

Mégaphorbiaies eutrophiles
20. *Convolvution sepium*

Mégaphorbiaies oligohalines
13. *Calystegio sepium* - *Althaeion officinalis*

Mégaphorbiaies mésotrophiles acidiphiles à acidiclinales
1. *Achilleo ptarmicae* - *Cirsion palustris*

Mégaphorbiaies mésotrophiles et neutrobasiophiles
56. *Thaliccro flavi* - *Filipendulion ulmariae*

Ourlets acidiphiles et oligotrophiles

Melampyro pratensis - Holcetea mollis Passarge 1994

1 Ourlet mésohygrophile à mésophile dominé par *Pteridium aquilinum*.

[*Pteridium aquilinum*, *Holcus mollis*, *Teucrium scorodonia*, *Molinia caerulea*, *Hieracium umbellatum*, *Hyacinthoides non-scripta*]

Ourlets dominés par la fougère aigle des sols acides oligotrophes à mésotrophes
31. *Holcus mollis* - *Pteridium aquilini*

Ourlets nitrophiles

Gallio aparines - Urticetea dioicae Passarge ex Kopecký 1969

1 Communauté nitrophile des lisières externes des boisements et des haies, ou intraforestière, sur des sols généralement bien alimentés en eau.

[*Alliaria petiolata*, *Glechoma hederacea*, *Gallium aparine* subsp. *aparine*, *Anthriscus sylvestris*, *Chelidonium majus*, *Stellaria neglecta*]

Gallio aparines - *Alliarietalia petiolatae*
2

1' Ourlet sub-nitrophile des sols humides, plus ou moins hydromorphes.

[*Rumex sanguineus*, *Impatiens noli-tangere*, *Myosotis sylvatica*, *Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *C. pendula*, *C. strigosa*, *Cardamine impatiens*]

Ourlets peu nitrophiles, hygrophiles et sciaphiles
33. *Impatiens noli-tangere* - *Stachyon sylvaticae*

2 Ourlet nitrophile externe ou interne (mais toujours légèrement éclairé), **hémihéliophile**, presque mésohygrophile.

[*Aegopodium podagraria*, *Lamium maculatum*, *Silene dioica*, *Cruciata laevipes*, *Lamium album*, *Dipsacus pilosus*, *Sambucus ebulus*, *Carduus crispus*, *Ficaria verna* (= *Ranunculus ficaria* L.)]

Ourlets nitrophiles hygroclines et héliophiles
2. *Aegopodium podagrariae*

2' Ourlet nitrophile interne, **sciaphile**, mésophile.

[*Torilis japonica*, *Geranium lucidum*, *Epilobium montanum*, *Alliaria petiolata*, *Chaerophyllum temulum*, *Moehringia trinervia*, *Poa nemoralis*]

Ourlets nitrophiles, mésophiles et sciaphiles
28. *Geo urbani* - *Alliarietalia petiolatae*

Friches nitrophiles dominées par les vivaces

Artemisieta vulgaris Lohmeyer, Preisig & Tüxen ex von Rochow 1951

1 Friche dense, de hautes herbes, nitrophile, mésohygrophile à mésoxérophile planitiaire à montagnarde

[*Lamium album*, *Arctium lappa*, *A. minus*, *Artemisia verlotiorum*, *Conium maculatum*, *Ballota nigra*, *Armoracia rusticana*]

Friches nitrophiles dominées par les vivaces, mésohygrophiles à mésoxérophiles
7. *Arctium lappae*

Microphorbiaies

Montio fontanae - *Cardaminetea amarae* Braun-Blanquet & Tüxen ex Klika & Hadač 1944

1 Communauté **calcicole** souvent en situation **intra sylvatique**, des sols souvent oligotrophes, dominée par les phanérogames.

[*Chrysosplenium oppositifolium*, *Lysimachia nemorum*, *Stellaria nemorum* s.l., *Chrysosplenium alternifolium*, *Cardamine flexuosa*, *Ranunculus hederaceus*, *Carex remota*, *Stellaria alsine* ;

Bryophytes : *Rhizomnium punctatum*, *Plagiomnium undulatum*, *Pellia epiphylla*, *Rhynchostegium riparioides*]

Microphorbiaies neutro-alkalines dominées par les phanérogames
17. *Caricion remotae*

<p>1' Communauté acidicline à neutrophile et héliophile. [Montia hallii (= Montia fontana L. subsp. amporitana/subsp. variabilis), Stellaria alsine ; Bryophytes : Pellia neesiana, Scapania paludosa, Chiloscypus polyanthos]</p>	Microphorbiales acidiphiles à neutrophiles 24. Epilobio nutantis - Montion fontanae
<p>Prairies flottantes et cressonnières Glycerio fluitantis - Nasturtietea officinalis Zohary ex Géhu & Géhu-Franck 1987</p>	
<p>1 Communauté rampante des eaux stagnantes ou légèrement fluantes de petites hélophytes graminéennes peu diversifiée des dépressions marquées par l'alternance de périodes d'inondation et d'exondation (prairie flottante). [Glyceria fluitans, Catabrosa aquatica, Leersia oryzoides, Glyceria notata, Callitriche stagnalis]</p>	Prairies flottantes européennes 29. Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti
<p>1' Communauté des bordures de cours d'eau, frais et peu profonds, ainsi que des suintements permanents (cressonnière). [Berula erecta, Nasturtium officinale, Helosciadium nodiflorum, Oenanthe crocata]</p>	Cressonnière européenne 6. Apion nodiflori
<p>Roselières et cariçaies Phragmito australis - Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V. Novák 1941</p>	
<p>1 Roselière et cariçaie des eaux saumâtres du littoral, de plus ou moins grande taille. [Bolboschoenus maritimus, Schoenoplectus tabernaemontani, Juncus maritimus, Oenanthe foucaudii, ainsi que diverses espèces généralement rencontrées en haut de prés salés]</p>	Roselières saumâtres atlantiques et continentales 53. Scirpion compacti
<p>1' Roselière et cariçaie des eaux douces. [Phragmites australis, Typha latifolia, Glyceria maxima, Oenanthe aquatica, Carex elata, C. acuta, C. riparia, Ranunculus lingua, Equisetum fluviatile, Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Phalaris arundinacea, Galium palustre, Lythrum salicaria]</p>	2
<p>2 Communauté de taille moyenne à grande (de type cariçaie), sur sols riches en matière organique, à éléments fins, mésotrophes à eutrophes, dominée par des hélophytes du genre Carex à inondation moins prolongée que pour une roselière. [Carex elata, C. paniculata, C. acuta, C. acutiformis, C. disticha, Cladium mariscus, Scutellaria galericulata, Stachys palustris, Lysimachia vulgaris, Galium palustre, Lathyrus palustris]</p>	Magnocaricetalia elatae 3
<p>2' Communauté d'hélophytes de grande taille (de type roselière), à inondation régulière et prolongée, sur sols généralement minéraux, eutrophes à éléments grossiers, souvent à matrice vaseuse. [Phragmites australis, Glyceria maxima, Oenanthe aquatica, Equisetum fluviatile, Rumex hydrolapathum, Sparganium erectum, Alisma plantago-aquatica, Iris pseudacorus, Rorippa amphibia, Sium latifolium, Ranunculus lingua]</p>	Phragmitetalia 4
<p>3 Communauté de taille moyenne généralement fermée et pauvre en espèces, des sols mésotrophes à dystrophes souvent tourbeux, dominée par des hélophytes des genres Carex (notamment les espèces qui forment des touradons) ou Cladium. [Carex elata, C. paniculata, C. rostrata, C. vesicaria, C. pseudocyperus, Cladium mariscus]</p>	Cariçaies des sols mésotrophes à dystrophes 37. Magnocaricion elatae
<p>3' Communauté des sols argilo-humifères eutrophes à anmoor.</p>	Cariçaies des sols eutrophes à anmoor

[<i>Carex acuta</i> , <i>C. acutiformis</i> , <i>C. riparia</i>]	15. <i>Caricion gracilis</i>
4 Communauté, plutôt pionnière, des bordures perturbées des eaux calmes. [<i>Oenanthe aquatica</i> , <i>Rorippa amphibia</i> , <i>Sagittaria sagittifolia</i> , <i>Sparganium emersum</i> , <i>Butomus umbellatus</i> , <i>Bolboschoenus maritimus</i> s.l., <i>Eleocharis palustris</i> , <i>Alisma plantago-aquatica</i>]	Parvoroselières pionnières des bordures perturbées des eaux calmes 41. <i>Oenanthon aquaticae</i>
4' Communauté des zones à nappe d'eau à faible variation de niveau. [<i>Phragmites australis</i> , <i>Cladium mariscus</i> , <i>Equisetum fluviatile</i> , <i>Thelypteris palustris</i> , <i>Schoenoplectus lacustris</i> , <i>Typha latifolia</i> , <i>T. angustifolia</i> , <i>Glyceria maxima</i>]	Roselières hautes à <i>Phragmites australis</i> 45. <i>Phragmition communis</i>
Tourbières	
Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici Braun-Blanquet & Tüxen ex V. Westhoff, Dijk, Passchier & Sissingh 1946	
1 Végétation de tourbière de haut-marais , généralement ombrotrophe à ombrominérotrophe , des climats doux et très arrosés (influence atlantique). L'activité turfigène y est importante . [<i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Eriophorum vaginatum</i> , <i>Erica tetralix</i> , <i>Narthecium ossifragum</i> , <i>Drosera rotundifolia</i> , <i>Eriophorum angustifolium</i> ; Bryophytes : <i>Sphagnum magellanicum</i> , <i>S. papillosum</i> , <i>S. subnitens</i> , <i>S. rubellum</i> , <i>S. capillifolium</i>]	Banquettes et buttes de sphaignes turfigènes de hauts-marais sous influence océanique 44. <i>Oxycocco palustris</i> - <i>Ericion tetralicis</i>
1' Végétation de tourbière de bas-marais , généralement minérotrophe et faiblement turfigène , faisant la transition entre les tourbières du haut-marais de l' <i>Oxycocco palustris</i> - <i>Ericion tetralicis</i> et les landes hygrophiles. [<i>Juncus squarrosus</i> , <i>Trichophorum cespitosum</i> subsp. <i>germanicum</i> , <i>Erica tetralix</i> ; Bryophytes : <i>Sphagnum compactum</i> , <i>S. molle</i> , <i>Leucobryum glaucum</i> , <i>S. tenellum</i>]	Landes hygrophiles paratourbeuses faiblement turfigènes 25. <i>Ericion tetralicis</i>
Landes	
Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Braun-Blanquet & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944	
1 Landes, généralement secondaires, intérieures ne subissant pas les influences de la mer, caractérisées par l'absence de formes prostrées et de espèces littorales. [<i>Ulex minor</i> , <i>U. europaeus</i> , <i>Erica tetralix</i> , <i>E. ciliaris</i>]	Landes intérieures 57. <i>Ulicion minoris</i>
Fourrés nains crassulésents littoraux	
Salicornietea fruticosae Braun-Blanquet & Tüxen ex A. Bolòs & O. Bolòs in A. Bolòs 1950	
1 Fourré crassuléscent lié aux marais salés soumis à un régime de marées, communauté du schorre eu-halin cantabro-atlantique à atlantique. [<i>Halimione portulacoides</i> , <i>Sarcocornia fruticosa</i> (= <i>Arthrocnemum fruticosum</i> (L.) Moq.), <i>S. perennis</i> subsp. <i>perennis</i> (= <i>Arthrocnemum perenne</i> (Mill.) Moss), <i>S. perennis</i> subsp. <i>alpini</i> (= <i>Arthrocnemum fruticosum</i> (L.) Moq. var. <i>deflexum</i> Rouy)]	Fourrés nains halophiles des schorres euhalins 30. <i>Halimionion portulacoidis</i>

Fourrés mésophiles à hygrophiles des sols pauvres

Franguletea alni Doing ex V. Westhoff in V. Westhoff & Den Held 1969

- 1' Fourré mésotrophile à oligotrophile, hygrophile à mésohygrophile, caractérisé ou différencié des fourrés plus mésophiles par *Salix aurita*, *Alnus glutinosa*.

[*Salix aurita*, *Alnus glutinosa*, *Agrostis canina*, *Sphagnum* spp., consulter en complément niveaux 2 et 2']

- 1' Fourré mésophile à mésohygrophile, acidiphile, sous influence plutôt thermo-atlantique.

[*Ulex europaeus*, *Rubus ulmifolius*, *Hedera helix*, *Pteridium aquilinum*, *Calluna vulgaris*, *Frangula dodonei*]

- 2 Fourré à tendance plutôt eury-atlantique marqué par la présence d'espèces atlantiques.

[*Salix atrocinerea*, *Myrica gale*, *Erica tetralix*, *E. scoparia*, *Osmunda regalis*, *Blechnum spicant*, absence ou rareté des espèces des Phragmites australis – *Magnocaricetea elatae*]

- 2' Fourré sub-atlantique à continental dans lequel certaines espèces atlantiques manquent, ce type de fourré correspond à l'optimum de *Salix cinerea* pour la classe (rappelons cependant que ce *Salix* participe aussi à des syntaxons des *Crataego monogynae* - *Prunetea spinosae*), présence fréquente d'espèces des roselières et cariçaies (Phragmites australis - *Magnocaricetea elatae*).

[*Salix cinerea*, *Lysimachia vulgaris*, *Phragmites australis*, *Lythrum salicaria*, *Solanum dulcamara* var. *dulcamara* ; absence de *Myrica gale*, *Erica tetralix*, *E. scoparia*, *Osmunda regalis*]

Fourrés mésophiles à hygrophiles des sols riches

Crataego monogynae - *Prunetea spinosae* Tüxen 1962

- 1 Communauté arbustive hygrophile, mésotrophile à eutrophile, des vallées alluviales et des secteurs à fort battement de nappe phréatique.

[*Viburnum opulus*, *Salix cinerea*, *Ribes nigrum*, *Frangula dodonei*, *Lonicera periclymenum*]

Forêts marécageuses

Alnetea glutinosae Braun-Blanquet & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946

- 1 Boulaie des substrats tourbeux, acides et oligotrophes. La strate herbacée y est assez clairsemée, s'exprimant au sein d'une strate muscinale dense, dominée par les espèces du genre *Sphagnum*.

[*Betula pubescens*, *Sphagnum palustre*, *S. fimbriatum*, *S. flexuosum*, *Alnus glutinosa* (occasionnel)]

- 1' Aulnaie des substrats très organiques à tourbeux liée à un engorgement permanent du sol, mésotrophes à eutrophes. La strate herbacée est dominée par les espèces des roselières, des cariçaies ou des prairies hygrophiles. La strate muscinale, lorsqu'elle est présente, est assez ouverte et n'est jamais dominée par les sphaignes.

[*Alnus glutinosa*, *Carex elongata*, *Phragmites australis*, *Phalaris arundinacea*, *Solanum dulcamara* var. *dulcamara*, *Lysimachia vulgaris*, *Lycopus europaeus*, *Carex* spp., *Juncus effusus*, *Lotus pedunculatus*, etc.]

Salicetalia auritae
2

Fourrés acidiphiles oligotrophiles, mésophiles à mésohygrophiles

26. *Frangula alni* – *Pyrrhon cordatae*

Fourrés marécageux mésotrophiles à oligotrophiles euryatlantiques

43. *Osmundo regalis* – *Myricion gale*

Fourrés marécageux mésotrophiles à oligotrophiles subatlantiques à continentales

51. *Salicion cinereae*

Fourrés alluviaux

50. *Salici cinereae* – *Rhaminion catharticae*

Aulnaies tourbeuses

55. *Sphagno* - *Alnion glutinosae*

Aulnaies marécageuses

4. *Alnion glutinosae*

Forêts riveraines et alluviales

Salicci purpureae - Populetea nigrae Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T. E. Díaz, Fernández-González & Loidi (1991) 2001

- 1 Communauté arborescente, de type aulnaie-frénaie riveraine (non marécageuse), des cours d'eau, des substrats à bonne capacité de rétention en eau (limons, argiles) et à faible fluctuation du niveau de la nappe alluviale.
[*Alnus glutinosa*, *Fraxinus excelsior* et/ou *Ulmus minor*, *Rubus caesius* ; la strate herbacée est dominée par les espèces des mégaphorbiaies (*Filipendula ulmaria*, *Convolvulus sepium*, *Symphytium officinale*, *Equisetum telmateia*, etc.), des suintements ombragés (*Carex remota*, *Chrysosplenium* spp., etc.) ou des ourlets nitrophiles (*Urtica dioica*, *Aegopodium podagraria*, *Geum urbanum*, *Schedonorus giganteus* (= *Festuca gigantea* (L.) Vill.)].]

Forêts riveraines et alluviales

5. *Athion incarnae*

Forêts mésophiles à mésohygrophiles

Quercu roboris - Fagetea sylvaticae Braun-Blanquet & J. Vlieger in J. Vlieger 1937

- 1 Forêt mésohygrophile, des sols généralement lourds à bonne réserve hydrique (mais non engorgés), présence fréquente de colluvions.
[*Fraxinus excelsior*, *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, *Acer campestre*, *Fagus sylvatica* peut être présent mais non dominant (sauf faciès de sylviculture) ; *Ficaria verna* (= *Ranunculus ficaria* L.), *Adoxa moschatellina*, *Circaea lutetiana*, *Cardamine flexuosa*, *Primula elatior*, *Cardamine impatiens*, *Isopyrum thalictroides*]

1' Chênaie mésohygrophile à hygrophile, des sols engorgés dès la surface, généralement peu diversifiée. Le Hêtre ne s'installe pas du fait de la présence de sols trop asphyxiants. Le Chêne ne se développe généralement pas très bien.
[*Quercus robur*, *Betula pubescens* ; *Frangula dodonei*, *Salix atrocinerea*, *S. aurita* ; *Molinia caerulea* (très abondante et formant des touradons), *Potentilla erecta*]

Forêts mésohygrophiles neutro-acidiclines à calcicoles

27. *Fraxino excelsioris* - *Quercion roboris*

Chênaies mésohygrophiles à hygrophiles, acidiphiles et oligotrophiles

39. *Molinio caeruleae* - *Quercion roboris*

Herbiers flottants des eaux riches en éléments nutritifs

Lemnetea minoris O. Bolòs & Mascians 1955

- 1 Groupement dominé par des **petits végétaux** flottant librement à la surface de l'eau (non enraciné) ne fleurissant pas (ptéridophytes et bryophytes aquatiques) ou à floraison très discrète (Lemnaceae).

1' Groupement dominé par des végétaux flottant librement à la surface de l'eau (non enraciné) de **taille plus importante** (< 3 cm).
[*Utricularia vulgaris*, *Ceratophyllum demersum*, *Hydrocharis morsus-ranae*, *Utricularia australis*, *Ceratophyllum submersum* et *Stratiotes aloides*]

2 Groupement dominé par des Araceae Lemnoideae (anciennement Lemnaceae) **flottant à la surface de l'eau**, incluant également des espèces flottant sous la surface de l'eau, mais ces dernières ne constituent pas la strate dominante.
[*Lemna gibba*, *Wolffia arrhiza*, *Spirodela polyrrhiza*, *Azolla filiculoides*, *Lemna minor*]

2' Groupement dominé par des Araceae Lemnoideae (anciennement Lemnaceae) et (ou) des bryophytes aquatiques (Ricciaceae) **flottant sous la surface de l'eau**.

Lemnetalia minoris

2

Herbiers flottants des eaux mésotrophes à méso-eutrophes

59. *Hydrocharitum mosrus-ranae*

Voiles flottants des eaux méso-eutrophes à hypertrophes

60. *Lemnion minoris*

Voiles flottants des eaux oligo-mésotrophes à méso-eutrophes
61. *Lemno trisulcae* - *Salvinion natantis*

PROGRAMME

"Identification des végétations de zones humides par bassin versant"

> L'Orne et la Dives

TOME 1

- Rapport de synthèse
- Glossaire

TOME 2

- Clé de détermination des alliances phytosociologiques des végétations de zones humides du bassin versant de **l'Orne**

TOME 3

- Clé de détermination des alliances phytosociologiques des végétations de zones humides du bassin versant de **la Dives**

TOME 4

- Fiches descriptives des groupements végétaux de zones humides



Télécharger l'ensemble des productions sur
www.cbnbrest.fr

TOME 2

Clés de détermination des groupements végétaux de zones humides du bassin versant de l'Orne

Le Conservatoire botanique national de Brest, en partenariat avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et le Conseil Régional de Normandie, a proposé et mis en œuvre un projet de connaissance, d'identification et d'élaboration d'outils de reconnaissance des végétations de zones humides pour les acteurs locaux : catalogues, clés de détermination et fiches descriptives de ces végétations. Les deux premiers bassins versants concernés sont l'Orne et de la Dives.

Zone humide, végétation, phytosociologie, catalogue, clé de détermination, fiche descriptive, bassin versant de l'Orne, bassin versant de la Dives

Conservatoire Botanique National



CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
NATIONAL
DE BREST



Conservatoire botanique national de Brest

**Siège, service international,
jardin, service éducatif,
et antenne Bretagne**
52 allée du Bot
29 200 BREST
02 98 41 88 95
cbn.trest@cbnbrest.com

Antenne Basse-Normandie
Parc estuaire entreprises
Rte de Caen
14 310 VILLERS-BOCAGE
02 31 96 77 56
cbn.bassenormandie@cbnbrest.com

Antenne Pays de la Loire
28 bis rue Babonneau
44 100 NANTES
02 40 69 70 55
cbn.paysdeloire@cbnbrest.com

web | www.cbnbrest.fr

Syndicat mixte qui regroupe Brest métropole,
Conseil départemental du Finistère, Conseil régional de Bretagne
et Université de Bretagne Occidentale.